

筆

花

醫

鏡

筆花醫鏡卷之三

浙江歸安江涌暎筆花著

兒科目錄

兒科論治

初生保治

外熱內熱辨

非驚論

痰火閉症

木侮土症

大驚猝恐

夜啼

吐瀉

傷暑

食積痞積蟲積痰積水積

疳症

咳嗽

盜汗自汗

解顙龜胸龜背

此外諸症治法與方脈同故不贅叙

筆花醫鏡卷之三

浙江歸安江涌曠筆花著

兒科論治

小兒之病百倍難於方脈其疾痛疴癢不能自言旁人又不能代言全恃醫家以意揣之揣之不恰發人易於反掌即揣得其當而小兒純陽之體易虛易實藥一過分變幻百端此非絕頂聰明好學深思心知其意者未易勝任也至於護惜之深姑息之至則飽煖失宜藥物恣食畏苦廢藥或求速離投則又非醫

家之咎矣。然揣之之法，不過辨其表裏虛實寒熱。其法與方脈無異。其症亦與方脈同。方脈中之病，小兒亦無不有也。故不能兒科者，或能治方脈，不能方脈者，必不能兒科。

初生保治

初生三朝，即用三黃湯解其胎毒。服三四日後，每日投金銀花湯至彌月而止，可保其痘稀而少瘡疹之患。若遇寒冬之月，或小兒體寒質薄，則專用金銀花湯亦可。彌月間，聲直，陰掣撮口，臍風是胎風也。俗名腹裏驚，因其母肝氣鬱，小兒稟受之，再浴時斷臍時。

或有進風得外風則內風動此症發之太早泣不出
聲泣而無淚者皆難治治法痰盛者先治痰火盛者
先清火或用益黃散治之視其牙齦有泡急以絲裹
指擦破之用青黛冰片略塗口內為妙至三歲以前
形質微弱無脈可憑但察其脈之強弱緩急而已須
更審其食指寅卯辰三關男左女右食指近手第一
節為寅關次節為卯關上節為辰關凡兒有病必有
脈紋外現如現紋在寅關不過卯關者易治連卯關
者難治過辰關者更難治若一條紋從寅關直透卯
透辰者必死其紋青色為風紫為瀉痢青紫為肝火

乘脾紅則為熱合之唇舌面色亦可得其大槩也三
歲後六七至為平脈四五至為寒九十至為困脈弦
急為氣不和沉緩為傷食促結為虛驚浮為風沉細
為寒脈亂者不治

內熱外熱辨

外熱與內熱不同外熱者身終日發熱或拘束肢冷
外有清涕咳嗽頭痛鼻塞之象內則脈浮而不渴此
外解之症也不可用涼藥宜荊防散表之得汗自愈
內熱者如夜熱潮熱晝輕夜重病最纏綿或口渴或
腹脹或盜汗其症有因傷食停痞伏燥伏火陰虛陽

虛等異宜分別而治此內解之症也不可用表藥傷
食者保和丸加地骨皮消之停痞者和中丸加醋甲
牡蠣消之伏燥者貝母瓜蒌散潤之伏火者黃芩芍
藥湯加山梔丹皮等清之陰虛者黃皮四物湯退之
陽虛者四君子湯養之此等執久必傷陰日漸削瘦
成為疳癆慎勿忽視

非驚論

方脈中有中寒中暑諸症時醫混以為中風東垣景
岳以非風別之善矣兒科有急驚風慢驚風二症不
惟驚字全無干涉即風字亦不可混稱乃自有驚風

之名而溫以九子相投從此小兒之遭劫者亦不知
萬萬矣試思驚字何解凡受嚇者謂之驚嚇則神魂
失守心神恍惚惕惕悸動唯心虛者易犯此在方脈
中亦有之兒科中大驚猝恐一症即此候也是真驚
也故用藥以人參五味棗仁丹參等安神定魂為主
斷無有攻痰散風而能治驚症者且風字亦有二義
在外感則為風邪宜用表散在內病則為肝風宜用
鎮息今混言之曰風究竟外風乎內風乎治外風之
藥不可以治脈治肝風之藥不可以解表甚矣哉其
混也蓋時俗所謂急驚風者痰火閉也小兒受暑熱

則生火。乳積則生痰。痰火相搏則血虛而肝失所養。肝主筋。筋脈乾熱則抽搐。故外作拘攣。面現青色。是肝燥而風內動。非外風也。是痰火閉其竅。而目竄牙緊發厥。非嚇驚也。但利其竅。清其火。降其痰。則神醒矣。此症即不醫。亦能自醒。而漫以驚風名之。可乎。世俗所謂慢驚風者。脾虛生風也。小兒或吐或瀉久則脾虛。肝木乘之。手足微搐。是內風侮土。非外風也。陽衰神怠。氣息短促。是中氣脫乏。非嚇驚也。宜補其脾。回其陽。則土振而木靜矣。此症不補必死。而謬以驚風名之。可乎。且急驚為實火症。慢驚為虛寒症。如水

然治急驚藥不可以治慢治慢驚藥不可以治急而世俗竟有以一粒丹丸名之曰治急慢驚風欺人乎欺天乎茲特並揭之曰非驚而分為痰火閉症木侮土症則為實為虛當各求其病源而治之而小兒庶不至於枉死

痰火閉症

痰火之症即俗所謂急驚風也小兒或感風寒或積乳食皆能生痰痰積則化火或受暑熱亦生火失於清解則火升而痰亦升痰火上壅閉其肺竅則諸竅皆閉其症目直氣喘昏悶不醒耳火甚則肝燥筋急

為搐搦掣顛反引竄視而八候生焉總因痰火鬱結
肝風內動而成當其拘攣弓仰之時但以手扶勿可
用力抱緊傷其筋絡致成廢疾初起以通關散開其
竅得嚏則醒輕者利火降痰湯重者清膈煎加石菖
蒲竹茹或抱龍丸醒後清熱養血湯

木侮土症

木侮土症即俗所謂慢驚風也小兒受暑受寒或傷
乳食皆能作吐作瀉或吐瀉交作久則脾土虛弱肝
木乘之其瀉漸見青色面部萎白帶青手足微搐無
力神氣懨懨不振而慢脾成矣初起即宜異功散吐

則加藿香煨薑若病已數日糞見青色則加木香或肉桂若手足皆冷脈息微細唇舌痿白此將脫之症急宜用附子理中湯以溫中回陽尚有可救諸臟之症皆緩獨脾病之變甚速僅有一晝夜吐瀉而即脫者甚勿緩視也

大驚猝恐

大驚猝恐真驚也小兒氣血未充心神怯弱一遇驚嚇則神魂震怖舉動失常夜則跳醒晝則驚惕治宜安神魂斂心氣七福飲秘旨安神丸安神定志湯皆可心有蘊熱而驚悸者七味安神丸神定後氣虛者

四君子湯以補其陽血虛者六味地黃丸以補其陰
若妄投以硃砂鎮驚丸子耗其心血則愈發愈盛肝
風乘虛而亢其勢不可復制矣慎之

夜啼

夜啼之症有二一曰脾寒一曰心熱若僅胃停乳食
則不能安寐而已不啼也脾寒者溫其脾而啼止藿
香和中湯主之心熱者清其心而啼亦止導赤散加
川連主之或花火膏亦可切勿亂投消痰破氣之藥
致損真元

吐瀉

小兒吐瀉之症最多或專吐或專瀉或吐瀉交作止
因傷食而吐瀉者腹必硬所吐所瀉必有酸臭氣保
和丸消之因伏暑而吐瀉者小水必不利必兼煩渴
吐則香薷飲瀉則四苓散加益元散或導赤散加川
連清之因受寒而吐瀉者唇舌面色必癢白口不渴
四肢或冷此症易成慢脾始則平胃散二陳湯加煨
薑以溫其中繼則六君子湯以補其脾若虛寒甚則
附子理中湯不可稍緩其因伏火而吐瀉者身必熱
唇舌必赤清中飲導之火退後仍宜四君子湯以養
其脾蓋火吐則乳飲不得入一入即出寒吐則乳飲

受而後出此其辨也然吐瀉久則脾胃必虛肝木必侮無論因何而起凡大吐大瀉之後即有火亦清有食亦出速宜培補脾陽勿使氣脫

傷暑

小兒性秉純陽不受火迫一染邪暑熱焰沸張其症肌熱煩躁口渴唇紅溺瀉急宜香薷飲調服益元散以解之且暑中有濕濕易傷脾故每作瀉利甚者兼吐治法詳吐瀉門若受暑風而清涕頭痛者用香薷飲加秦艽荆芥主之若熱動肝風而發搐厥宜用清熱湯利其暑熱而風自息昏悶者通關散啟其嚔切

勿輕用治驚化痰之品戕其正氣變生他症

食積痞積蟲積痰積水積

諸積皆屬於脾脾土果旺則何物不化至於成積脾力之弱可知已然積既已成勢不能不用藥以消夫欲消因脾之積必更傷受困之脾願治積者必時時顧念脾土而後可食積者肚腹必硬膨脹拒按吞酸噯腐不思飲食保和丸大和中飲等消之脾虛者六君子湯參用痞積或瘕後痰結或血裏肝氣伏於兩脇下時痛時止和中丸消之外貼消痞膏氣虛者六君子湯參用蟲積者濕熱所化也蟲有九而血籠最

狼虵蟲最馴寸白蟲上能蝕肺柳葉蟲下能蝕肝凡
患蟲症則唇內起白點若蟲長一尺貫胃則危冲心
則死其人自漸消瘦蟲則吸血自肥當以化蟲丸下
之腹痛則服花椒湯蟲聞椒則伏也下後仍以異功
散養脾痰積者飲食所積脾不能化則釀而為痰其
症初起時兩脈皆弦腹漸脹大而軟急宜六君子湯
加厚朴麥芽萊菔子等以消之若遷延日久則痰積
愈多一旦上湧發為厥逆則吐之不能下之不得無
藥可治也水積者即水腫之症治法具詳首卷

疳症

疳者乾也。久熱傷陰，津液乾涸之症，俗名童子癆。其症總因飲食不節，積滯化火，漸或生瘡生蟲，致成骨蒸內熱，銷灼其陰。其症腹大青筋，髮直毛焦，肌膚枯燥，唇舌絳紅，而疳症成矣。此症陰血既槁，勢已難回。況又有熱未清，積未去乎？善治者必乘其陰血未槁之時，清其火，消其積，存其陰，調其脾胃，尚克有濟。初治宜清熱導滯湯，有蟲者唇內起白點，以化蟲丸間服。若陰分既虛，則用理陰和中煎，胃口不開，則並用異功散，調其胃，俾得陽生陰長，庶幾有救。大約此症腹軟者惟虛可治，為其能受補也；腹硬者難治，為其

不可消也

盜汗自汗

盜汗為陰虛自汗為陽虛然亦有秉質如此終身以為常此不必治也若平日並無此症又非夏秋暑月而無端盜汗者宜四物湯加龍骨牡蠣浮小麥北五味之屬以養其陰無端自汗者宜四君子湯加北五味牡蠣以養其陽或加玉屏風散亦可

咳嗽

小兒咳嗽半由於風寒初起以杏蘇煎散之痰薄者加半夏生薑痰濃者加川貝花粉瓜蒌仁之屬肺有

火邪則瀉白散此一定之治法也若秋冬燥令肺受火刑則咳而無痰甚者咳血宜以貝母瓜蒌散潤其肺清肅之氣下行則咳自止

解顛龜胸龜背

解顛者腦蓋未滿頭顛不合中陷而四角起如古錢之形此先天不足所致暑月服六味地黃丸冬春之月補天大造丸俟氣血漸充則自合矣龜胸者肺熱作脹胸骨高起須白虎湯加瀉白散以涼肺氣若喘急者難治也龜背者背骨高突如龜此先天不足督脈為病補天大造丸加金毛狗脊治之

兒科列方

三黃湯

黃芩

黃柏

川黃連

大黃各一錢

濃煎將絲絲作乳頭狀蘸藥時時令吮每日五六回不必盡劑

益黃散

陳皮錢一

青皮

訶子肉

炙草各五分

丁香三分

荆防散

荆芥錢一

防風

蘇梗

川芎

陳皮各八分

杏仁錢二

甘草

薑皮各二分

保和丸

山楂炭

茯苓

萊菔子

各一錢五分

神曲

半夏

陳皮

連翹

各一錢

和中丸

白朮

二兩

扁豆

茯苓

砂仁

半夏

各一兩

枳實

神曲

炒麥芽

查炭

香附

丹參

各一兩五錢

陳皮

五穀蟲

各二兩

共為末每服三錢

貝母瓜蒌散

川貝

二錢

瓜蒌仁

一錢五分

山梔

黃芩

橘紅

各一錢

甘草五分

熱甚加川連八分痰多加膽

星五分

黃芩芍藥湯

黃芩

白芍

各二錢

生甘草

一錢

蒿皮四物湯

生地

三錢

北沙參

炙龜甲

各二錢

歸身

白芍

青蒿

各一錢

地骨皮

一錢五分

丹皮

八分

甘草

五分

四君子湯

人參

茯苓

各一錢

白朮

一錢五分

炙甘草

五分

大棗三枚

通關散

細辛

皂角錢各三

生半夏錢二

共研末吹入鼻孔取嚏

利火降痰湯

黃連八分

連翹錢一分五分

山梔

滑石錢各二

木通

黃芩

枳實

瓜蒌霜

車前錢各一

勾藤錢四

柴胡錢六分

甘草錢三分

清隔煎

製膽星

木通錢各一

白芥子

川貝錢各二

海石錢三

陳皮一錢五分

抱龍丸

膽星錢二

天竺黃一錢五分

雄黃

辰砂各一錢

麝香分三

共為末糊丸燈心湯下

清熱養血湯

細生地錢三

丹參一錢五分

黑山梔

青蒿

丹皮錢各一

赤芍分八

生甘草分五

異功散 即前四君子湯加陳皮一錢

附子理中湯

人參 白朮錢各二

附子 乾薑

炙草錢各一

七福飲

人參

熟地

錢各三

歸身

棗仁

錢各二

白朮

一錢五分

炙草

錢一

遠志

分五

秘旨安神丸

人參

棗仁

茯神

半夏

錢各二

歸身

白芍

橘紅

各一錢五分

北五味

炙草

各五分

生薑片三

安神定志丸

茯苓

茯神

人參

龍齒

錢各一

遠志

分五

七味安神丸

黃連 當歸 麥冬 茯苓 甘草 各二錢

珠砂 三錢 水片 二分

共研末為丸燈心湯下一錢

六味地黃丸

熟地 四錢 山藥 萸肉 各二錢 丹皮 澤瀉

茯苓 各二錢 五分

藿香和中湯

藿香 八分 厚朴 砂仁 陳皮 炙草 各五分

牛黃 二分 此方加蒼朮白芷蘇梗川芎香附查

炭麥芽治感寒停食

導赤散

生地錢二

木通

麥冬

車前

竹葉

錢各二

甘草分三

加燈心三十寸虛者加人參五分

花火膏

燈花

三

煎湯

香薷飲

香薷

扁豆

厚朴

各一分

條

炙草

分五

四苓散

白朮錢一

赤苓錢三

木通

豬苓

各一分

車前

澤瀉

各一分

錢

拉元散

滑石粉錢六 生甘草錢一

平胃散

藿香 厚朴各一錢五分 蒼朮八分 陳皮錢一

二陳湯

製半夏 陳皮 茯苓各一錢五分 炙甘草五分

生薑二片

六君子湯 即前四君子湯加半夏錢一 陳皮錢一 清中飲

川連五分

釵石斛 生穀芽各三錢

赤苓

車前

錢各二

酒茶

藿香

分各八

加薑汁炒竹茹一錢五分

清熱湯

勾藤

錢四

山梔

連翹

青蒿

各一錢五分

殭蠶

赤芍

香薷

錢各一

滑石

錢二

川連

柴胡

分各五

大和中飲

炒麥芽

查炭

錢各三

枳實

砂仁

分各六

陳皮

厚朴

澤瀉

各一錢

化蟲丸

蕪荑

雷丸

錢各五

枳榔

木香

白朮

陳皮 神曲各三錢 雄黃五分

共為末糊丸使君子肉三錢煎湯送下三錢

清熱導滯湯

胡黃連五分 地骨皮 查炭各二錢 青蒿

山梔 大腹皮各一錢 炒麥芽三錢 枳榔

厚朴 丹皮 生甘草各一錢 加紅棗五枚

溫陰和中煎

生地 北沙參 生穀芽各三錢 地骨皮

首烏 青蒿子 炒麥芽 椿耳皮 杜鵑各一錢

白芍 查炭各一錢 厚朴 丹皮各一錢

四物湯

熟地錢四

歸身

白芍各一錢五分

川芎一錢

玉屏風散

生黃耆錢五

防風分八

杏蘇煎

杏仁錢二

蘇梗

前胡

赤芍

荆芥各一錢

陳皮分八

桔梗

甘草各五分

漏白散

蜜炙桑白皮一錢五分

地骨皮錢二

白虎湯

補天大造丸

生石膏四錢

知母一錢五分

糯米一撮

甘草五分

人參二兩

黃耆

白朮各三兩

當歸

棗仁

山藥

茯苓

各一兩五錢

熟地

枸杞

各四錢

河車一具

用鹿角一斤龜板八兩熬膏同為丸

筆花醫鏡卷之四

新安江浦張華花著

婦人科目錄

婦女證論

月經

帶下

胎前諸症

產後諸症

天台程鍾齡女科一卷悉從諸大案論能中斟酌

室女

肝氣

嗣孕

臨產將護法

書而出之字字毫髮無憾並無近世臨證指南
等書巧習亂陳依古每收實功茲卷大半宗此以
為史料正統此亦附錄與方脈同治省概不贅叙

調經種子湯

當歸

川芎

熟地

香附

白芍

茯苓

陳皮

茱萸

丹皮

元胡

水煎

若過期而

色淡加官桂炮姜艾葉若先期色紫者加炒黃
芩俱用生薑為引如經至之日服起每日一服
經止不必服即當入房必成孕矣

一種子要論素女論云男有三至女有五至如男至
而女未至女至而男未至皆不成孕又如陽精
先至陰血後至則精聚血而成女陰血先至陽
精後至則血開裹精而成男故卜書云陰包陽

丹桂發芽陽包陰紅蓮吐萼

何謂男有三至陽痿不舉肝氣未至也強合則精流而不射舉而不堅腎氣未至也強合則精散而不聚堅而不熱心氣未至也強合則精冷而不溫此男子無子之道也

何謂女有五至交感之時面赤而熱心氣至也目中涎瀝微視人肝氣至也嬌聲低語口鼻氣喘肺氣至也伸舌吮唇以身侵人脾氣至也玉戶開張液流露腎氣至也皆至陽施陰受有子之道也

華花醫統卷之四

丹江歸來山滿眼華花著

婦人證論

婦女之病不肯對人言與小兒之不能自言其難治一也醫家又未便逐細詢問則更暗中摸索矣然大要不離乎中情鬱結者近是蓋婦女本坤陰吝嗇之性心地淺窄識見迂拘一有逆意即牢結胸中又不能散悶於外則鬱久而成病矣主治之法審無外感內傷別症唯有養血疎肝四字用四物湯道遇散之

類可以得其八九其一切雜病與方脈同治茲不贅
叙若胎前產後此其生死交關處詳叙於後慎勿忽
諸

室女

室女天癸未至有病從幼科論天癸既行則與婦人
同治矣然其神完氣足經水應無愆期其有時經閉
者若非血海乾枯必其經脈逆轉血枯則內熱咳嗽
漸成怯癯經逆則為吐衄血必妄行皆非輕候也
須速治之如或經水適來偶阻溺竅則小便不通腹
脹欲死急宜通其經而便自利用調經飲更有心熱

煩悶如饑懨懨倦怠此其情實以開慾火內熾
所致為父母者察知其意速宜擇配定期以安其心
若溺愛以留或不愛冰間勢必相火刑金咳嗽發熱
吐血而成癆瘵慎勿選婿過備而俾令飲恨以終也

月經

經者常也月行有常度經水有常期其愆平常者皆
病也方書以過前為熱退後為寒此說亦難盡信要
之察其色總以紅為正其變為紫黑者熱也黃如米
泔者濕也淺紅淡白者虛也或成塊而紫黑色黯者
寒凝也成塊而紫黑色明者熱結也將行而腹痛拒

按者氣滯血凝也既行而腹痛喜按者氣虛血少也
經前發熱者為血熱經後發熱者為血虛腹脹者為
氣滯腹痛者為血滯泄瀉者是脾虛瀉瀉者是寒濕
凡逆行上溢而吐衄錯行下流而暴崩皆屬熱血妄
行而亦有絡脈損傷瘀積肝旺所致若經水過多者
色淡為虛色深為熱或兼赤白帶而下者臭者為濕
熱腥者為寒濕

血枯與經逆者並用益母勝金丹加牛膝主之
經阻溺竅者調經飲並澤蘭湯主之

經水紫黑者生地四物湯加丹參丹皮益母草

經閉者八珍湯主之

實如未消者六君子湯加減仁烏且

寒凝成塊者四物湯加桂心牛膝

熱結成塊者生地四物湯加丹參丹皮益母草

氣血凝滯而作痛脹者調經飲或四物湯加延胡

香附木香

氣血虛少而或痛或熱者四物湯加入參白朮

滋陰補利者六君子湯主之

血熱而上下妄行者四物湯加丹皮阿膠黃芩黑

山梔

絡脈傷而妄行者或喜怒或過勞八珍湯主之
瘀血積則血不歸經獨聖丸主之
肝之旺不能藏血者逍遙散主之
其兼赤帶白帶者五苓散加減治之

肝氣

肝氣者婦女之本病婦女以血為主血足則盈而木
氣盛血虧則熱而木氣亢木盛木亢皆易生怒故肝
氣唯婦女為易動焉然怒氣泄則肝血必大傷怒氣
鬱則肝血又暗損怒者血之賊也其結氣在本位者
為左脇痛移邪於肺者右脇亦痛氣上逆者頭痛目

痛胃腕痛氣旁散布下注者手足筋脈拘攣腹痛小
腹痛癰瘰乳巖陰腫陰癢陰挺諸症其變病也不一
隨症而治之

左脇痛肝氣不和柴胡疎肝散若七情鬱結用逍
遙散解恨煎

右脇痛用推氣散如肝癰而皮泡脹痛者瓜蒌散
頭痛者痛或連眉稜骨眼眶逍遙散主之

目痛者蒺藜湯加柴胡山梔

胃脘痛者沉香降氣散柴胡疎肝散並主之

手足筋脈拘攣者肝氣熱也五瘥湯加黃芩丹皮

腹痛者木乘土也芍藥甘草湯主之

小腹痛者疝瘕之氣橘核丸主之

瘰癧者血燥有火也消瘰丸散之兼服逍遙散

乳巖者逍遙散歸脾湯二方間服

陰腫陰瘰陰挺諸症逍遙散主之甚則龍膽瀉肝

湯

帶下

帶症有青黃赤白黑之分亦不必分屬五臟總之必不外乎脾虛有濕而已用五味異功散加扁豆苡仁山藥澤瀉無不愈者倘挾五色則加本臟藥一二味

亦可若有欲加黃柏蓮心為得

青色屬肝異功散加柴胡山梔

黃色屬脾加石斛衛氣陳來

赤色屬心加當歸丹參

白色屬肺倍加苡仁

黑色屬腎加杜仲續斷

調經

求嗣之法別無他術只有實心待人廣行善事而已
男子葆精女子調經詩曰婦人和平則樂有子男女
有病或氣血不足隨症調理無不得子者至有孕之

脈左寸心脈動甚為孕子之兆。心主血。心脈旺則血旺。故知有子。若兩尺旺。身重寸逆。亦為有子。若其流利。雖身重。亦為孕。脈整。經脈閉塞不行。故脈疾而歇。至此數月之胎也。或謂兩尺皆浮大。生二男。兩手皆沉實。生二女。若經斷三月。以川芎末煎艾湯。空心服之。腹內微動者。即胎也。

揀精之道。首宜寡慾。次宜服藥。

真水虛而在尺。無力者。六味丸。合五子丸。或在歸丸。

其次衰而右尺無力者。八味丸。合五子丸。或右歸丸。

九

兩尺俱無力者十補丸合五子丸

精薄不凝者六味丸合五子丸加魚鱉膠角膠之
屬

氣虛不能射遠者贊育丹主之

調經之法見於月經篇

血熱者益母勝金丹加生地丹皮

血寒者益母勝金丹加肉桂

氣滯腹痛者四物湯加延胡香附木香薤白芍飲

氣虛者四物湯加人參白朮黃耆

氣血並虛者毓麟珠主之

胎前諸症

妊娠之月宜節慾食淡勿過勞亦勿過佚日常走動以活其胎屏絕嗔怒以靜其性自然易生易育兒亦聰明多壽矣然兒在腹中為時又久一切皆能致病備舉其症以示治法

惡阻者濁氣閉塞中脘停痰眩暈嘔吐滿悶宜二陳湯加枳壳主之脾虛者六君子湯加蘇梗砂仁香附

胎動不安者起居不慎也安胎飲主之

胎漏者經水忽下血瀝盡則胎不安四物湯加防
風黃芩主之如血虛加揆苓阿膠艾葉氣虛下
陷者補中益氣湯

子懸者胎上逼也紫蘇飲加減主之更有氣逆而
厥暈者名曰子眩其症甚危亦用前藥如脾虛
挾痰則六君子湯

胎不長者產母宿疾所致五味異功散或八珍湯
主之

子煩者煩心悶亂也四六兩月居多火盛而煩淡
竹葉湯若氣滯而悶宜二陳湯加白朮黃芩蘇

梗枳壳

子癇者血虛受風忽然口噤反張其症最暴受風者羚羊角散定之若怒動肝火者佐以逍遙散胎氣上逆者佐以紫蘇飲

子鳴者小兒口中脫出胞乳腹內哭聲也須腰曲就地如拾物狀一二刻疙瘩仍入兒口即止用四物湯加白朮茯苓以安胎氣

子瘖者腎脈繫舌本為胎氣壅閉故不能言不須服藥分娩後自能言矣

小便不通者小腸有熱也四物湯加黃芩澤瀉主

之然有胞胎墜壓胞系繚亂點滴不通者名曰轉胞其禍最速茯苓升麻湯主之或服補中益氣湯隨服而探吐之

胎水腫滿者名曰子腫由胞胎壅遏水飲不流所致五皮飲加白朮茯苓主之脾虛不能制水者六君子湯

乳自出者名曰乳泣生子多不育八珍湯補之熱病損胎者病熱而胎損腹中也古方用黑神散下之或平胃散加朴硝五錢下之更穩產母面赤舌青其子已損若面青舌赤母亦難全慎哉

小產者未足月欲生總因勞傷所致宜急用安胎
飲以安之既產而腹痛拒按者瘀血也當歸澤
蘭湯主之

小產後血不止或煩渴面赤脈虛微者氣血大虛
也八珍湯加炮薑補之若腹痛嘔瀉脾胃虛也
香砂六君子湯加薑桂

臨產將護法

臨產之月一宜善養勿呆坐勿多睡勿飽食常食糜
粥以解飢渴天熱則擇涼處天寒則擇煖室二宜選
穩須預請老練穩婆備辦需用之物臨產時但用老

婦二人撐扶不許多人喧鬧三宜服藥懷孕八月宜服保產無憂湯二三劑臨產時再服此劑撐開道路則兒易生如或連日不產用力太早宜服加味八珍湯以助其力人生人係天生人有自然之造化不假人力強為其有調護失宜而為逆產者則命在呼吸備列方法以保兩全

凍產者天寒氣血凝滯難以速生須煖其室厚其衣服

熱產者暑月過熱恐頭目昏眩而生血暈宜就涼處若水閣風雨更宜謹避

橫生者兒方轉身用力太急也產母宜安然仰臥
令老練穩婆先推兒身順直以中指揉兒肩不
令臍帶扳羈然後用脫花煎催之產母努力兒
即順生

倒產者兒未轉身努力太早手脚先出也令穩婆
輕手推入若良久不生穩婆手入產門就一邊
撥轉兒頭服脫花煎

偏產者兒已轉身母努力太急逼兒頭偏一邊雖
露頂非也乃額角耳令穩婆輕手扶正其頭兒
即下若兒頂後骨偏注穀道露額穩婆輕手於

殺道外旁托正產母努力即生

擬產者兒轉身時臍帶絆其肩以致不生穩婆輕手推兒向上以中指按兒肩脫去臍帶即生

盤腸產者臨產子腸先出然後生子腸出時以潔淨漆罌盛之用草麻子四十九粒研爛塗產母頂即收腸急洗去其藥其腸若乾以磨刀水少許溫潤之又有用麻油指燃點燈吹息以烟薰其鼻腸即上

交骨不開有鎖骨者有血虛不能運達者令穩婆以麻油調滑石塗入產門或用兩指緩緩撐開

服加味歸芎湯脫花煎

產門不開氣血虛也八珍湯補之如不應十全大補湯

胞衣不下者因力乏不能努力宜用物繫定再服歸芎湯即下或血入胞衣脹大不下心腹脹痛喘急急用清酒送失笑丸三錢其衣自下如不應花蕊石散牛膝散亦得

產後諸症

產後最宜將護一曰倚坐上牀以被褥靠之暑月以櫬靠之不可遽然睡倒須至十日後方可平睡常以

手從心摩至臍下俾瘀露下行二曰擇食初生後宜專食粥半月後方可食打開雞卵滿月後可食羊肉猪蹄等物三曰避風養神少言語大忌梳頭濯足恐招風濕四曰服藥初產畢即用生化湯或歸薑湯以驅瘀血自然安吉其有他症者隨症而治之

產後血暈者瘀血上攻胸腹脹痛拒按宜歸芎湯下失笑丸若去血過多心慌自汗用歸薑飲加人參甚則加熟附子

產後不語者由心腎不交氣血虛弱所致七珍散歸脾湯並主之若虛火上炎六味地黃丸

產後發熱者若無風寒表邪之象則血虛也四物湯加黑薑補之或加童便為引更效如有脾虛傷食用異功散加神曲麥芽大凡風寒發熱晝夜不退若血虛與傷食發熱則晡熱晨退然傷食更必吞酸噯腐滿悶以此為別更有氣血大虛陰躁作渴者乃陽隨陰散之危候十全大補湯救之

狂言如見鬼神者有敗血上衝胸腹脹痛宜澤蘭湯並失笑丸若血虛神不守舍則心慌自汗宜安神定志丸加人參歸芎治之歸脾湯亦得

心神驚悸者心血虛空也七福飲秘旨安神丸之類

汗多變癰者陽氣大虛也十全大補湯主之

產後身痛若徧身手按更痛者瘀血凝滯也四物湯加黑薑桃仁紅花澤蘭化之若身痛喜按者血虛也四物湯加黑薑參朮補之若兼風寒必頭痛鼻塞惡寒宜古拜散加當歸川芎秦艽黑薑散之

產後腰痛若上連脊背下連腿膝者風也獨活寄生湯主之若專腰痛者虛也八珍湯加杜仲續

斷肉桂若惡露不盡痛如錐刺者速用桃仁湯
化之免作癰腫

產後心腹諸痛受風寒者口鼻氣冷停食者吞酸
噎腐俱用二香散惟瘀血作痛若刀錐之刺失
笑丸主之其中氣虛寒腹中冷痛得熱則止者
理中湯加桂心若小腹痛處有塊不可手按者
此名兒枕痛瘀滯也失笑丸主之

惡露不絕者因肝氣不和用逍遙散因脾不統血
用歸脾湯若因瘀滯而新血不得歸經必腹痛
拒按歸芎湯下失笑丸

勞者寒熱食少頭脹肢痛最難調治八珍湯養之

喘促者榮血暴竭衛氣無依最為難治六味地黃湯加人參若脾肺兩虛四君子湯加黑薑當歸若瘀血入肺口鼻起黑氣及鼻衄者此肺胃將絕之候急服參蘇飲如厥冷自汗更加附子間有得生者

產後乳少由元氣虛弱八珍湯主之若乳房掀脹是未通也速宜吮通服王不留行湯若為兒口吹氣壅腫不通不急治即成乳癰速服瓜蒌乳香散敷

香附餅若兒飲不盡留乳作腫亦如前治法亦有
鬱怒而乳腫者於瓜蒌乳香散內加柴胡赤芍橘
葉甘草

乳腫初起由膽胃熱毒服瓜蒌乳香散或香附餅
即消如已成膿則以神仙太乙膏貼之吸盡膿
則愈矣

乳巖初起內結小核不赤不痛漸大而潰形如熟榴
肉潰深洞此脾肺鬱結氣血虧損最為難治初起
用加味逍遙散加味歸脾湯二方間服亦可內消
及其病勢既成雖有盧扁亦難為力

乳卸者乳頭拖下一二尺此肝經風熱發泄用小
柴胡湯加羌防主之草麻子四十九粒麝香一
分研塗頂心候乳頭收上即洗去

婦人科列方

益母勝金丹 調經行血

砂仁拌熟地 酒蒸當歸 酒蒸羌蔚子

土炒上白朮 酒炒香附各四兩 酒炒白芍

酒蒸丹參各二兩 酒蒸川芎二兩五錢

以益母草八兩酒水各半熬膏蜜丸開水下

獨聖丸 去瘀積

五靈脂去土炒 為末醋丸酒送下

蒺藜湯 治目赤腫痛

白蒺藜一錢五分 荆芥 赤芍各一錢 羌活

防風各七

甘草五

加有鬚葱白二段

龍膽瀉肝湯

治肝經濕熱

龍膽草

澤瀉各一

車前子

木通

生地

山梔

酒炒當歸

黃芩

甘草各五

解恨煎

治暴怒傷肝氣逆脹滿

陳皮

半夏

厚朴

茯苓

各一錢五分

蘇葉

芍藥各一

砂仁七

如脇筋脹痛加白芥子

一錢如胸膈氣滯加枳壳香附藿香

調經飲

治經阻氣滯而作痛者

當歸三

牛膝

山楂

香附各二

青皮

茯苓 各一錢五分

五子丸 此方同六味丸八味丸合成為種子之方

枸杞子 菟絲子 各四兩 五味子 車前子

覆盆子 各二兩

加石斛六兩熬膏蜜丸開水下四錢

贊育丹 治男子精衰陽痿而艱子息

熟地 白朮 各八兩 當歸 枸杞 各六兩 杜仲

仙茅 韭子 巴戟肉 山茱萸 淫羊藿

肉蓯蓉 各四兩 蛇床 附子 肉桂 各二兩

毓麟珠 治婦人氣血虛而經不調不孕者

人參 白朮 茯苓 芍藥 川芎 炙草

杜仲 鹿角霜 川椒各二兩 熟地 當歸

兔熊子各四兩 蜜九空心服

安胎飲

當歸 川芎 白朮 熟地 茯苓 阿膠各

白朮錢五 炙草 艾葉各三

紫蘇飲

當歸 川芎 紫蘇錢各一 炙草 人參

白朮各五 大腹皮八分 加薑一片總白一寸

淡竹葉湯

淡竹葉片^七

黃芩

知母

麥冬錢各一

茯苓

錢二

羚羊角散

羚羊角

獨活

當歸錢各二

川芎

茯神

防風

炙甘草分各

鈎藤錢三

桑寄生錢二

人參分八

茯苓升麻湯

治娠姪小便不通

茯苓

赤白各五錢

升麻一錢五分

當歸錢二

川芎錢一

苧根

錢三

或調琥珀末二錢服更佳

黑神散

隆冬寒月及體氣虛寒者服此

桂心

當歸

芍藥

炙草

乾薑

生地

各二兩

黑豆

二兩

附子

泡去皮五錢

當歸澤蘭湯

當歸

澤蘭

酒芍

川芎

熟地

一錢五分

延胡索

紅花

香附

丹皮

各五分

桃仁粒七

保產無憂湯

臨產日先服一二劑

酒洗當歸

一錢五分

川貝

一錢

黃耆

八分

艾葉

七分

酒芍

二錢二分

兔絲子

一錢四分

薑汁炒厚朴

七分

甘草

五分

枳壳

六分

川芎

一錢三分

羌活

五分

荆芥

八分

薑三片

加味八珍湯

人參 白朮 各一錢

茯苓 八分

當歸 五錢

炙草

川芎 一錢五分

酒芍 二錢

熟地 一錢五分

乳香

酒炒丹參 三錢

益母草 二錢

加味歸芎湯

當歸 五錢

川芎 三錢

龜板 三錢 車便炙

婦人頭髮

一握 煨 灰存性

脫花煎

凡將產先服此藥催生最佳胎死腹中加

朴硝 三錢 即下

當歸 八錢

肉桂 二錢

川芎

牛膝 各子

重前

子五分錢

紅花錢一

失笑丸

治瘀血脹胞並治兜枕痛

五靈脂

炒去土

蒲黃炒

等分為末醋丸每服

三錢酒服

花蕊石散

服此瘀血化水其人即甦

花蕊石

片一

土色硫黃

兩四

為末和勻入瓦罐封固用炭煅二炷香取研

童便酒下

牛膝散

治胎衣脹急緩則不救

牛膝

川芎

炒蒲黃

丹皮

各一

桂心

錢四

當歸一兩五錢 共為末每服五錢水煎

生化湯 產後去瘀要藥

當歸三錢 黑薑五分 川芎一錢五分 益母草一錢

桃仁七粒

歸薑湯 產後心慌自汗

當歸三錢 黑薑七分 炒棗仁一錢五分

七珍散

人參 石菖蒲 生地 川芎各一兩 防風

辰砂各五錢 細辛一錢 為末薄荷湯調下

古拜散 產後受風諸症

荊芥穗 為末每服三錢生薑湯調下

獨活寄生湯

獨活 桑寄生 防風 秦艽 威靈仙

牛膝 扶苓各一錢 桂心五分 細辛 炙草

各三分 當歸 金毛狗脊各二錢

桃仁湯

炒桃仁十粒 當歸三錢 牛膝二錢 澤蘭三錢

蘇木一錢

二香散 散寒消食

砂仁 木香 黑薑 陳皮 炙甘草各一兩

香附三兩 共為末

參蘇飲

人參一兩 蘇木三錢

王不留行煎

王不留行一分錢 通草一分錢 赤芍五分錢 葱白

頭五個 炒麥芽三錢

瓜蒌乳香散

瓜蒌一個 明乳香二錢 酒煎服

香附餅

香附兩 麝香分二 共研勻以蒲公英二兩煎

酒誦藥散之

神仙太乙膏 治一切癰疽

元參 白芷 當歸 肉桂 生地 赤芍

太黃各一 黃丹十三兩 用麻油二斤熬藥

去渣成珠入黃丹再熬為膏

四物湯 逍遙散 一澤蘭湯

八珍湯 六君子湯

生地四物湯即四物湯去熟地用生地

五苓散 翼功散

六味丸即六味地黃湯 二陳湯 補中益氣散 五皮飲

平胃散 香砂六君子湯 十全大補湯 理中

湯即附子理中湯 小柴胡湯以上諸方俱見首卷

柴胡疎肝散 瓜蒌散 五癢湯 芍藥甘草湯

橘核丸 消瘰丸以上見肝部

推氣見肺部

沉香降氣丸 歸脾湯 十補丸 安神定志丸

七福飲 秘首安神丸以上見心部

左歸丸 八味丸 右歸丸以上見腎部

附方

重刊牛痘簡易說

計開

南海邱浩川先生引種牛痘方書內載痘毒二五
妙合精行血就時當下之毒以其為先天所種非
後來之毒故有謂天瘡者其未出時果屬何家著
於何地古來列說紛紛皆是捕風捉影吾知人身
百骸未生元始之初先結右腎謂之命門以其為
受命之門也其毒如一小櫻桃結在命門如胆藏
肝然內所包孕者僅氣而已此真陰中毒輕者其

氣清重者其氣濁尤重者其氣黑毒惟有囊包孕

故未有感觸藏之若無一洩而吉凶便判按古以

苗塞鼻引種之法

此由氣分者故從鼻而入

必由五臟層遞而

入亦必由五臟層遞而出惟毒有輕重兼臟氣有

寒熱虛實故其症即有順逆

明辨曰謂內傷飲食積滯燥熱胎毒隨氣

觸動邪火痘出稠密

蓋邪火盡化為痘非胎毒有如許之多也故失於清解多不能救或為風寒所

東隱伏不出失於升散變症多端亦有不救其有

元氣虛弱不能送毒出外失於溫補亦致不救更有逆症初起無救雖神工

妙劑不能奏效豈不傷哉

方書內載今種牛痘法擇於兩臂中消燥清冷淵二

穴上下交連之處種之似與鼻苗法有異殊不知

人身兩臂乃少陽三焦經也三焦者人身最關要
之處如天地之三元總領五臟六腑營衛經絡通
內外左右上下之氣三焦通則內外左右上下皆
通得其關要之處引之直從皮毛血脈肌肉筋絡
同時直傳而入此由血分者故不擾動臟腑縱使有胎毒深藏
於腎亦自然同時引挈而出如引路然引諸坦途
則無顛躓之患如引絲然引其端緒則無勢亂之
憂金鑑所謂引其毒於未發之先者即此意考諸內經並
御纂醫宗金鑑接其銅人圖之消燦清冷淵二穴
乃三焦之門戶也三焦原與命門一貫故可直達
張遜玉種痘新書所謂以佳苗而引胎毒斯毒不

牛痘方

橫而疰自順者亦此意

今苗種自牛而來是以取效最捷蓋牛土畜也人之

脾屬土以土引土同氣相感同類相生故不必用藥其最妙者牛苗能解痘毒耳故凡種

痘皆用引法而引毒從皮毛血脈肌肉筋骨同時

而出則牛痘為最捷也

釋疑曰牛痘與鼻苗痘所爭不過氣血之分耳不知

氣與血二者本相流通人藉氣以生未有不資血以活血如不行氣能獨運乎○歷代醫學各家論痘曰痘者胎中之陰毒也可見胎毒之氣質本乎陰陰則從血無疑義矣

方書內載不論春夏秋冬隨時皆可不揀天氣不擇

日期不避風不禁忌不問男女不拘大小自小兒

生百日後但現在無瘡癩疳積諸疾病便可隨時

引種明辨曰由血者陰也濁不忌穢不由氣則營

衛協和故不繁熱不發熱則毫竅閉故不避

風此自然
之理也

方書內載出痘時宜辨自引之後並不發熱起初一
二日所刺處常如蟻咬至第三四日始露形影發
出痘尖頂脫血跡第五六日起如小泡週圍灌水
第六七日水足灌漿微微覺癢第八九日灌漿滿
足俱見微熱第九日十日脚外紅暈隨散微熱必
退半月之外靨落有疤細看疤內更有幾點小疤
居其中此確憑此種情形齊備可以告成功矣又
云天行之痘醫家先論形色牛痘則須分真假真
痘既出之後天行永不再出假痘仍要再種恐其

遇天行復出務須於此等辨清而種痘之小兒至

灌漿後亦必請原種痘之人看過方可保無誤也

按牛痘種此穴即出此穴無別出才理今兩臂共

種之多寡不同總須辨明真假方無後慮○種痘

之初至第四五日宜食素菜豆腐冬笋芡清湯

粥飯到灌漿時宜食鮮魚催助漿水其餘之日或

食瘦猪肉及一切清淡各物○忌雞鰾魚牛肉及

太酸太鹹一切煎炒熱毒

麪食凝滯之物俱不宜食

方書內載用鮮漿得力較全按牛痘出至第六七日

並之後仍復灌漿滿足大如圓珠並無虧損者可

見以毒引毒毫無所損故於嘉慶十年自西洋傳

至粵東由粵而至京都各省相繼盛行恩六十

年久未聞傳漿于兒童有碍者累損此益彼誰

無惻隱之心忍

以赤子為戲乎

方書內載種痘後斷不再出間有出者名曰小痘

真痘也猶之天花之後亦有水痘幸勿誤聽人言

認為再出水痘微熱三日起至第四日壯熱一晚

有似大痘者但其脚散而頂平無紅暈纏繞並不

足漿隨出隨收只須服清理藥數劑即可無恙切

勿聽信人言認為再出倘誤服補劑耗藥為害不

淺茲將水痘應服之方特為刊出再審其寒熱虛

實加減用之萬無一失華方附后

水痘方

川羌活 六分 北柴胡 一錢 北桔梗 一錢

陳只穀 八分

前胡 一錢

荆芥穗 一錢

北防風 一錢

白茯苓 一錢

蘇薄荷 四分

殭 蠶 一錢 粉甘草五分 加生薑一大片

為引 濕重者加蔓荊子一錢服一二劑後
熱退神清減去羌活柴胡二味再服一二劑
或熱有未清減去羌活柴胡二味加紫蘇葉
八分煎服如小兒虛弱者去薄荷只殼二味
多痰者加陳廣皮八分煎服無不應效

治癩狗齧傷經驗救急神效方

每年驚蟄後桃花正開、蟲蛇出洞、霜降後梅花正開、蟲蛇入洞、其出也必呼氣、其入也必吸氣、吐納之毒氣常流於洞口、犬性喜嗅、適感觸其毒、從口鼻吸入、遂病癩、名獠音制犬、春夏日桃花癩、秋冬日梅花癩、犬性義而善守、癩則不識人、不守家、頸硬頭低耳落、尾躡音妥直向前行、不能返身、顧後闖入人家、不拘生熟、遇人見犬、無不亂齧、好犬被齧、即觸毒而癩、若人不善避、或被齧、或啣衣、即觸毒氣、設自昧不覺、未經蚤治、或治之又未中肯、急則七日發作、緩則七七日

至百日定當發作卒病心腹絞痛如刀割裂神識不清痛劇中心無賴自抓其胸膺嚼其舌齧其指齧其膚肉甚至嚼衣服磁瓦不過二三時即死慘狀難言欲辨病證是否須以葵扇即蒲扇向病人重扇見風即身縮戰慄音栗畏甚又急鳴鑼聞聲即心驚惕不安確是中癩犬毒無疑即驗犬是否病癩亦以葵扇風試見風即戰慄又以鑼聲試聞聲即亂竄確是癩犬無疑當其觸毒尚未發作一聞鑼聲其癩即激發矣人與犬皆然僕曾見數人患此在旁觀皆不忍入目束手無策編考方書並無起死回生良法間有先用

原決

共研細末水為丸硃砂為衣如黃豆大用冷開水
吞服嘔吐痰涎即愈或嘴唇起泡亦愈惟服丸後
須過一個時辰吃烟吃飯